



Leikkaukseen tulevan potilaan kotilääkitys leikkauspäivänä

Seuraavia lääkkeitä ei oteta leikkauspäivän aamuna:

ACE-estäjä: Enalapriili, kaptopriili, kinapriili, lisinopriili, perindopriili, ramipriili, tsofenopriili ja niiden ”comp”- valmisteet.

AT-reseptorin salpaajat:

Eprosartaani, irbesartaani, kandesartaani, losartaani, olmesartaanimedoksomiili, telmisartaani, valsartaani ja niiden ”comp” valmisteet.

Kalsiumkanavan salpaajat:

Amlodipiini, diltiatseemi, felodipiini, isradipiini, lerkandipiini, nifedipiini, nikardipiini, nilvadipiini nimodipiini, nisoldipiini, verpamiili

Diureetit

(Digitalisglykosidit) = Digoxin

Beetasalpaajien yhdistelmävalmisteet eli Comp-valmisteet

Diabeteslääkkeet

- Tablettilääkkeet

- jätetään ottamatta leikkauspäivän aamuna
- Lisäksi tauotus 2 vrk aiemmin
 - metformiini
 - glimepiridi
 - glipitsidi
 - glibenklamidi

- Insuliinihoito

- Pitkävaikutteista insuliinia pistetään leikkauspäivän aamuna puolet normaalista aamuannoksesta leikkausosastolla (Protaphan)
- Pitkävaikutteista insuliini johdosta voidaan jatkaa normaaliannoksella leikkausosastolla (Lantus, Levemir, Toujeo)
- Victoza-inj.ei pistetä toimenpidepäivän aamuna

Plastiikkakirurgisilta potilailta tauotetaan Tamofen-lääke 1 kk ennen toimenpidettä ja 1 viikko toimenpiteen jälkeen.

Kotilääkkeet, jotka jatkuvat normaalisti:

Beetasalpaajat

Kipulääkkeet, jotka ovat jatkuneet potilaalla pitkään

Hormonikorvausvalmisteet

Kilpirauhaslääkkeet

Mielialalääkkeet

Syöpälääkkeet

Eturauhaslääkkeet

Primaspan voi ottaa toimenpidepäivän aamuna, mikäli vuorokausi annos ei ylitä 250 mg, mutta kaikkiin **selkäleikkauksiin tauko 10 vrk.**